Arpia 72 WP

Descripción del producto:

ARPÍA 72 WP, es un fungicida para uso foliar, formulado como una mezcla de dos ingredientes activos que le confieren al producto un doble efecto, preventivo y curativo, sistémico y de contacto.

COMPOSICION: 640 gramos de mancozeb + 80 gramos de cimoxanil por kilogramo de producto comercial.

MODO DE ACCIÓN: ARPÍA 72 WP es un fungicida de contacto y sistemia translaminar. Se usa como protectante y como curativo.

MECANISMO DE ACCIÓN: Acción antiesporulante, reduce potencial de infestación. Interrumpe la formación de la pared celular del hongo.
Además la accción multisitio del Mancozeb.

Presentaciones:

500 gramos

Cultivos donde se utiliza:

Papa, tomate, chile, tabaco, pepino, sandía, melón, ajo, cebolla, lechuga.

Indicaciones generales:

PRECAUCION: No debe mezclarse con productos de reacción alcalina. Se recomienda hacer pruebas de compatibilidad.

FITOCOMPATIBILIDAD: No es fitotóxico a los cultivos y dosis recomendados en el panfleto.

COMPATIBILIDAD: **ARPIA 72 WP** es compatible con insecticidas y fungicidas de uso agrícola.

Instrucciones de manejo:

ARPÍA 72 WP se aplica con aspersora de espalda, equipo mecanizado o aéreo. Para aplicaciones terrestres usar de 200 a 300 L de agua por hectárea (140 a 210 L de agua por manzana) de acuerdo al cultivo.
La dosis y frecuencia de aplicación dependen del clima, del grado de infección de la enfermedad y del estado de desarrollo del cultivo.
Preparación de la mezcla: Disuelva completamente la cantidad de Arpía, a usar, en una cubeta y luego depositela en el tanque de mezcla o mochila que debe contener agua hasta la mitad; complete el volumen de agua y agite hasta que la mezcla sea homogénea.

MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE:
No contamine ríos, lagos, canales de drenaje con este producto, o con envases vacíos, desechos, derrames o remanentes.

Enfermedad / Agente Causal	Dosis	I.A.C*	I.R**
Tizón tardío (*Phytophthora infestans*) Mildiu (*Peronospora destructor*) (*Peronospora cubensis*) (*Peronospora parasítica*) (*Bremia sp*)	1,5 a 2,0 kg/ha (1 a 1,5 kg/mz), 50 g por bomba de espalda de 17 litros. 1 medida de 25 mL equivale a 11,23 gramos	7 días	Cuando seque el follaje aplicado .

***Intervalo entre la última aplicación y cosecha **Intervalo de reíngreso**

Principales enfermedades que controla

Tizón tardío
(Phytophthora infestans)

Mildiu
(Peronospora parasítica)

agrocentro®

Fungicidas