agrocentro®

Herbicidas

Elimina 72 SL

Descripción del producto:

ELIMINA® 72 SL es un herbicida sistémico post-emergente, hormonal, para el control de malezas de hoja ancha. Es rápidamente absorbido por el follaje.

COMPOSICIÓN: 720 gramos de 2,4-D (ácido Dicloro-fenoxi-acético) por litro.

MODO DE ACCIÓN: ELIMINA® 72 SL se le incluye dentro de los herbicidas hormonales. Transportado de arriba hacia abajo (por el Simplasto), llegando de esta forma a todo los órganos de consumo y almacenamiento.

MECANISMO DE ACCIÓN: Interfiere en la síntesis de los ácidos nucleicos. Afectando la regulación del ADN durante la formación de ARN interrumpiendo el mensaje hacia las proteínas.

Presentaciones:

500 ml, 1L, 3.5L, 18L y 200L

Cultivos donde se utiliza:

Maíz, Sorgo, Maicillo, Caña de Azúcar, Arroz, Papa, Banano, Plátano, Cítricos, Aguacate, Palma africana, Hule, Piña, Uva, Potreros.

Indicaciones generales:

COMPATIBILIDAD y FITOTOXICIDAD: Es compatible con plaguicidas en forma de polvos mojables y solubles en agua, preparándolos aparte y agregándolos primero al agua de aspersión, pocos minutos antes de la aplicación.

No es compatible con herbicidas emulsionables (CE) en agua. No se recomienda aplicarlo con productos de reacción alcalina o utilizar agua con pH alcalinos. No mezclar con aceites minerales.
A pesar de su selectividad a gramíneas ésta puede perderse si no se aplica en la época apropiada del cultivo afectando sus rendimientos.

Aplicado a las dosis recomendadas no presenta síntomas de fitotoxicidad en los cultivos.

Instrucciones de manejo:

pH ÓPTIMO DEL AGUA: De preferencia abajo de 7, al momento de la mezcla.

ÉPOCA DE APLICACIÓN: Cuando las malezas tengan preferiblemente una altura no mayor de 15 cm de altura o bien de 3 a 4 hojas verdaderas, que es el momento de mayor actividad de crecimiento.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: En el tanque de mezcla llene hasta la mitad de su capacidad con agua, adicione la dosis de ELIMINA® 72 SL y complete el nivel de agua recomendada.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Es esencial hacer la aspersión con precisión y cubrir totalmente la maleza. Asegúrese de que las boquillas estén en buenas condiciones y que el aguilón de la aspersora esté ajustado a una altura adecuada que garantice la cobertura total.

II MODERADAMENTE PELIGROSO

Malezas	Dosis	I.A.C*	I.R**
Bledo o Hüisquilete (*Amaranthus viridis*) Mozote (*Bidens pilosa*) Yerba de pollo (*Commelina diffusa*) Pata de paloma o Papayita (*Croton lobatus*) Lechosa o Golondrina (*Euphorbia hirta*) Bejuco (*Ipomoea triloba*) Falsa Verdolaga (*Kallstroemia máxima*) Flor amarilla (*Baltimora recta*) Dormilona sensitiva (*Mimosa púdica*) Frijolillo o hediondilla (*Cleome spinosa*) Cinco negritos (*Lantana cámara*)	Se recomienda desde 0.75 a 1.5 litros por Hectárea	No aplica	0 días

***Intervalo entre la última aplicación y cosecha **Intervalo de reíngreso**

Principales malezas que controla

Pata de paloma o Papayita (*Croton lobatus*)

Falsa Verdolaga (*Kallstroemia máxima*)

Flor amarilla (*Baltimora recta)*

Cinco negritos (*Lantana cámara*)

agrocentro®

Herbicidas