



HN



## Descripción del producto:

**Amarre®**  
Fertilizante, foliar

**COMPOSICIÓN:** Este producto contiene 80 gramos de Cymoxanil + 640 gramos de Mancozeb por cada Kilogramo de producto comercial.

**MODO DE ACCIÓN:** Es un fungicida de contacto, sistémico para utilizar como protectante y curativo, penetra rápidamente de forma translaminar y se transloca acropetalmente, Además posee actividad sistémica local, lo cual mejora su efecto especialmente en periodos de alta presión de la enfermedad.

## RECOMENDACIÓN

**VER PANFLETO**



## MECANISMO DE ACCIÓN:

Arpia 72 WP, combina 2 ingredientes activos con diferentes mecanismos de acción y lo hacen muy eficiente para el control de hongos, Mancozeb; inhibe la respiración, afecta el ciclo de Krebs, impide formación de ATP, afecta lípidos de la membrana y Cymoxanil; interfiere con la síntesis de ARN, aminoácidos, lípidos, respiración celular y permeabilidad de membranas; dando como consecuencia la detención del crecimiento del hongo.

**Presentaciones:** 50g

100g

500g

1kg

200kg

## Principales hongos



Tizón tardío



Mildiu

| Hongos                           |                                                                               | Dosis                                                                                                                                                                                                                                                         | I.A.C*                | I.R**                                                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre<br>Tizón tardío<br>Mildiu | Nombre científico<br><i>Phytophthora infestans</i><br><i>Peronospora spp.</i> | Tomate, Papa, Chile pimiento, Berenjena, Tabaco, Melón, Sandía, Pepino, Ayote, Zucchini, Calabacín, Güicoy, Chayote, Calabaza: 2 a 3 kg/ha (1,5 a 2,0 kg/mz) en 200 litros de agua para aplicaciones terrestres y 25 - 30 L de agua para aplicaciones aéreas. | El IAC es de 14 días. | Después de que el producto se haya secado en el cultivo; aproximadamente en 12 horas. |

## Cultivo:

Papa



Tomate



Cucurbitáceas



**Cultivos autorizados:** Tomate, Papa, Chile pimiento, Berenjena, Tabaco, Melón, Sandía, Pepino, Ayote, Zucchini, Calabacín, Güicoy, Chayote, Calabaza.



**Amigo agricultor,  
CUIDA TU SALUD, COMO  
CUIDAS TU CULTIVO.**



## Instrucciones de uso



### Instrucciones de manejo:

**pH ÓPTIMO DEL AGUA:** 6-7

**FITOTOXICIDAD:** No es fitotóxico a los cultivos recomendados en este panfleto siempre y cuando se respeten las dosis recomendadas.

**COMPATIBILIDAD:** Se puede mezclar con la mayoría de los agroquímicos. No mezclar con productos alcalinos.

**ÉPOCA DE APLICACIÓN:** No exceder a 3 aplicaciones por ciclo de cultivo, con intervalo de 5 días, se recomienda hacer la 1era aplicación de forma preventiva y el resto con énfasis curativo.

**PREPARACIÓN Y MEZCLA:** Llene la aspersora con agua hasta la mitad de su capacidad, verificar el pH del agua, realice las correcciones necesarias de pH y dureza del agua, pH en un rango de 6-7, y dureza del agua no mayor a 60 PPM, realizar una premezcla para disolver la dosis recomendada, ya realizada esta, incorpore el fungicida al tanque de aplicación o a la aspersora manteniendo una agitación constante, adicionar el coadyuvante y por último llenar la aspersora con la totalidad de su capacidad con agua. Si se mezcla con formulaciones SL, SC, EC, realizar siempre su premezcla, y aplicar de primero su formulación WP, luego incorporar las otras formulaciones su coadyuvante agrícola y por último llenar la aspersora con la totalidad de su capacidad con agua.

**EQUIPO DE APLICACIÓN:** Arpía 72 WP, debe ser aplicado en forma de aspersión foliar, mediante equipo terrestre, accionado por tractor o aspersora de espalda o aspersoras de presión constante o aplicación aérea. El equipo debe estar en condiciones adecuadas de uso, utilizar boquilla que se acople a las condiciones del cultivo. Arpía 72 WP, no es corrosivo para los equipos de aplicación.



**Arpía**  
72 WP



**Fungicidas**

### Recomendación Técnica:

**Clic aquí:**  **(+502) 3764-5454**

ACTUALIZACIÓN DE DATOS • 2026



**agrocentro®**

Agricultura Próspera y Sostenible para Todos



**(+504) 2251-2300**



**AgrocentroHonduras**



**www.agrocentro.com**