

HN

Bastión
15 SL



agrocenro
Agricultura Próspera y Sostenible para Todos



Descripción del producto:

Bastión® 15 SL

Herbicida, Ácido fosforoso



VER PANFLETO

COMPOSICIÓN: Este producto contiene 150 gramos de Glufosinato de Amonio por cada litro de producto comercial.

MODO DE ACCIÓN: Es un herbicida no selectivo de contacto post-emergente a las malezas de hoja ancha y gramíneas en cultivos agrícolas. Las plantas absorben esta sustancia principalmente a través de las hojas y de otras partes verdes.

MECANISMO DE ACCIÓN: El mecanismo de acción es la inhibición de la enzima glutamina sintetiza en el metabolismo del nitrógeno. Al bloquear esta enzima se acumula amoniaco en las plantas lo que destruye las membranas celulares.

Presentaciones:

1 L

5 L

20 L

Principales malezas



Ipomea spp.



Portulaca oleracea



Sida acuta



Bidens pilosa



Digitaria sanguinalis

Malezas		Dosis	I.A.C*	I.R**
Nombre Zacate hediondo Verbena Hierba mora Dormidera Lechosa Clavelillo Batatilla Bejuco Coyulillo Caminadora Pata de ganzo Plumilla Arrocillo Pata de gallina Maicillo Gramilla Cola de caballo Hierba de pollo Verdolaga Centavillo Bledo Pata de gallina Hierba de pollo Mozotillo Tamarindillo Húngaro Flor de muerto Hierba blanca Paja cabezona Pasto bermuda Verdolaga Verdolaga de caballo Pasto bermuda Jaibilla Tamarindillo Golondrinas Bejuco Brizanta Escobillo Campanilla	Nombre científico <i>Panicum dichotomiflorum</i> <i>Verbena litoralis</i> <i>Solanum nigrum</i> <i>Mimosa</i> sp. <i>Euphorbia heterophylla</i> <i>Emilia fosbergii</i> <i>Bidens pilosa</i> <i>Ipomoea</i> sp. <i>Cyperus rotundus</i> <i>Rottboelia cochinchinensis</i> <i>Eleusine indica</i> <i>Leptochloa filiformis</i> <i>Echinochloa colonum</i> <i>Digitaria sanguinalis</i> <i>Sorghum halepense</i> <i>Cynodon dactylon</i> <i>Setaria</i> spp. <i>Kallstroemia máxima</i> <i>Portulaca oleracea</i> <i>Murdannia</i> spp. <i>Amaranthus spinosus</i> <i>Commelina</i> spp. <i>Kallstroemia máxima</i> <i>Bidens pilosa</i> <i>Phyllanthus niruri</i> <i>Cynodon</i> sp. <i>Chrysanthemum</i> sp. <i>Cardaria draba</i> <i>Paspalum virgatum</i> <i>Cynodon dactylon</i> <i>Portulaca oleracea</i> <i>Trianthema portulacastrum</i> <i>Cynodon dactylon</i> <i>Momordica charantia</i> L. <i>Phyllanthus niruri</i> <i>Euphorbia hirta</i> <i>Ipomoea</i> sp. <i>Brachiaria brizantha</i> <i>Sida cordifolia</i> <i>Convolvulus</i> sp.	Maíz, sorgo y trigo: 1 - 1,4 L/ha (0,70 - 0,98 L/mz) en 250 Litros de agua por hectárea (175 L de agua por ha). Banano, plátano y caña de azúcar: 2 - 2,5 L/ha (1,40-1,75 L/mz) en 200 Litros de agua por hectárea (140 L de agua por ha). Café: 1,5 L/ha (1,05 L/mz) en 345 Litros de agua por hectárea (241,5 L de agua por ha). Melón, sandía, pepino, calabaza, guicoy: 2,86 L/ha (2 L/mz) en 290 Litros de agua por hectárea (203 L de agua por ha). Palma africana: 2,0 L/ha (1,40 L/mz) en 200 Litros de agua por hectárea (140 L de agua por ha). Papaya: Papaya 2,10 L/ha (1,47 L/mz) en 160 Litros de agua por hectárea (112 L de agua por ha). NOTA: Aplicar cuando la maleza tenga una altura de 0,1 a 0,4 metros.	Cero días: Plátano, banano y palma africana. Catorce días: Melón, sandía, pepino, calabaza, guicoy, papaya, maíz, caña de azúcar, sorgo y trigo. Veinte días: Café.	12 horas.

*Intervalo entre la última aplicación y cosecha **Intervalo de reingreso

Cultivo:

Aguacate



Café



Papaya



Platano



Caña de azúcar



Cultivos autorizados: Aguacate, Maíz, sorgo, trigo, plátano, banano, caña de azúcar, café, melón, sandía, pepino, calabaza, güicoy, palma africana y papaya

**Amigo agricultor,
CUIDA TU SALUD, COMO
CUIDAS TU CULTIVO.**



Instrucciones de uso



Instrucciones de manejo:

pH ÓPTIMO DEL AGUA: 4-5

FITOTOXICIDAD: Es un herbicida no selectivo, evitar la deriva o hacer malas aplicaciones que pueden afectar cultivos vecinos.

COMPATIBILIDAD: Incompatible con agentes de propiedades alcalinas y ácidas. No mezclar con herbicidas fenoxi.

ÉPOCA DE APLICACIÓN: Una aspersión dirigida a la maleza, cuando las mismas estén en pleno crecimiento vegetativo 3 a 5 hojas y el suelo tenga humedad.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Verifique cual es el pH de su fuente de agua, puede utilizar tiras indicadoras de pH. Un pH en un rango de 4 a 5 es el recomendado para este producto. Si es necesario puede corregir el pH utilizando alguno de los coadyuvantes que se vende como reguladores de pH, antes de preparar la mezcla. Vierta la dosis requerida en medio tanque de agua, agitar y completar con el volumen de agua requerido. Una vez finalizada la aplicación se debe lavar el equipo.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Se recomienda el uso de bomba de aspersión manual, con boquilla tipo abanico, con una aplicación terrestre dirigido a la maleza, antes de utilizar el equipo de aspersión, revise cuidadosamente que se encuentre en buen estado de funcionamiento y sin fugas, debe calibrar con agua el equipo de aspersión para verificar que está aplicando la dosis correcta.

Bastión
15 SL



Herbicidas

Recomendación Técnica:

Clic aquí:



(+502) 3764 5454

ACTUALIZACIÓN DE DATOS • 2026



agrocentro®

Agricultura Próspera y Sostenible para Todos



(+504) 2251-2300



Agrocentro Honduras



www.agrocentro.com