

HN

Clorotac
72 SC



Descripción del producto:

Clorotac® 72 SC

Fungicida, Benzonitrilo, Halogenado.

COMPOSICIÓN: Este producto contiene 720 gramos de Clorotalonil por cada litro de producto comercial.

MODO DE ACCIÓN: Actúa sobre las esporas del hongo antes de la germinación de las mismas, impidiendo así el ingreso a las células de las hojas.

RECOMENDACIÓN



VER PANFLETO

MECANISMO DE ACCIÓN: Interrumpe varios procesos en la célula, incluyendo producción de enzimas, síntesis de aminoácidos; fabricación de proteínas y metabolismo celular.

Presentaciones:

500 mL

1 L

20 L

200 L

Principales hongos que controla



Erysiphe sp



Uromyces phaseoli



Alternaria solani



Colletotrichum
gloeosporoides



Mycosphaerella
fijiensis

Hongos		Dosis	I.A.C*	I.R**
Nombre	Nombre científico			
Mildiu polvoso	<i>Erysiphe sp</i>	Arveja china, ejote, frijol, mani, haba y soya: 2,14 L/ha 1,5 L/mz ó 3 a 5 medidas de 25 mL por aspersora de tanque de 17 litros de agua, dependerá del estado fenológico del cultivo.	14 días: Arveja china, ejote, frijol, maní, haba y soya.	Después de 12 horas que la mezcla del producto se haya secado en el follaje del cultivo tratado.
Roya	<i>Uromyces phaseoli</i>			
Mildiu vellosa	<i>Pseudoperonospora cubensis</i>			
Tizón temprano	<i>Alternaria solani</i>			
Tizón tardío	<i>Phytophthora infestans</i>			
Sigatoka negra	<i>Mycosphaerella fijiensis</i>	Melón, sandía, pepino, zucchini, ayote, calabacín, guicoy, chayote y calabaza: 1,79 a 2,15 L/ha; 1,25 a 1,5 L/mz ó 3 a 4 medidas de 25 mL por aspersora de 17 litros de agua.	0 días: Melón, sandía, pepino, zucchini, ayote, calabacín, guicoy, chayote, calabaza y soya, tomate, chile pimiento, berenjena, papa, tabaco, banano, plátano y papaya.	
Antracnosis	<i>Colletotrichum gloeosporoides</i>	Tomate, chile pimiento, berenjena, papa y tabaco: 0,75 a 1,25 L/ha; 0,5 a 0,87 L/mz ó 1,5 a 3 medidas de 25 mL por aspersora de tanque de 17 litros de agua; dependerá de la etapa fenológica.		
		Banano y plátano: 1 L/ha (0,7 L/mz) Papaya: 2 L/ha (1,4 L/mz).		

Cultivo:

Legumbres



Cucurbitas



Solanaceas



Banano y Plátano



Papaya



Cultivos autorizados: Arveja china, ejote, frijol, maní, haba, soya, melón, sandía, pepino, ayote, zucchini, calabacín, guicoy, chayote, calabaza, tomate, chile pimiento, berenjena, papa, tabaco, banano, plátano, papaya.

**Amigo agricultor,
CUIDA TU SALUD, COMO
CUIDAS TU CULTIVO.**



Instrucciones de uso



Instrucciones de manejo:

pH ÓPTIMO DEL AGUA: 5 - 6

FITOTOXICIDAD: Al aplicarlo de acuerdo con las recomendaciones indicadas en este panfleto, no causa fitotoxicidad.

COMPATIBILIDAD: Clorotac® 72 SC es compatible con plaguicidas cuya formulación es polvo mojable (WP), sin embargo, con los concentrados emulsionables y fertilizantes puede ser diferente, por lo tanto, no es posible predecir el grado de compatibilidad.

ÉPOCA DE APLICACIÓN: Arveja china, ejote, frijol, maní, haba y soya: 1 a 2 aspersiones a un intervalo de 7 días después de haber asperjado fungicida sistémico, en época de inicio de floración. Melón, sandía, pepino, ayote, zucchini, calabacín, guicoy, chayote y calabaza: Realizar de 3 a 4 aspersiones de fungicidas sistémicos a intervalos de 7 días, iniciando cuando la planta alcance los 30 días después de la germinación o trasplante. Aplicable en cultivos de tomate, chile pimiento, berenjena, papa y tabaco. 3 a 4 aspersiones a partir de los 7 días después de haber transplantado o cuando la planta tiene 15 días después de haber germinado. Banano y plátano: Dependerá de las condiciones climáticas y presión del inóculo (4-15 días). Papaya: Dependerá de las condiciones climáticas y si la incidencia del inóculo es mayor del 15%.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: No comer, beber o fumar durante el manejo y aplicación de este producto. De acuerdo a la dosis recomendada, el producto debe ser diluido en tanque de aspersora conteniendo agua limpia, se agita y se completa el volumen de agua requerido.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Al aplicar Clorotac® 72 SC, debe asegurarse de que el equipo de aplicación y sus boquillas estén en buen estado, sin fugas y debidamente calibrados con agua. La aplicación de este producto puede realizarse con equipo terrestre accionado por tractor, aspersora de espalda o equipo aéreo. El equipo de aplicación y los utensilios empleados en la mezcla y aplicación deben lavarse con suficiente agua después de cada jornada de trabajo. El personal debe utilizar botas, mascarilla, lentes protectores y guantes al manipular Clorotac® 72 SC.

Clorotac
72 SC



Fungicidas

Recomendación Técnica:

Clic aquí:



(+502) 3764-5454

ACTUALIZACIÓN DE DATOS • 2026



agrocentro®

Agricultura Próspera y Sostenible para Todos



(+504) 2251-2300



AgrocentroHonduras



www.agrocentro.com