



HN



Herbicidas



Descripción del producto:

Elimina® 60 SL

Herbicida, Fenoxi, 2,4-D.

COMPOSICIÓN: Este producto contiene 600 gramos de 2,4-D por cada litro de producto comercial.

MODO DE ACCIÓN: es un herbicida sistémico post-emergente a las malezas de hoja ancha, el cual es rápidamente absorbido por el follaje de las malezas.

RECOMENDACIÓN



VER PANFLETO

MECANISMO DE ACCIÓN: Interfiere en el metabolismo de los ácidos nucleicos. Actúa como auxina sintética e inhibe el crecimiento. Se absorbe por hojas y raíces luego se trasloca por el floema y xilema y se acumula en los meristemas.

Presentaciones:

500 mL

1 L

3.5 L

18 L

200 L

Principales malezas



Melampodium
divaricatum



Portulaca oleracea



Amaranthus spp.



Bidens pilosa



Commelina diffusa

Maleza		Dosis	I.A.C*	I.R**
Nombre	Nombre científico			
Tomatillo	Malva silvestre	Arroz: 2,55 - 4,0 L/ha (1,53 - 2,4 L/mz)	60 días.	24 horas.
Cardo santa	Malva parviflora			
Diente de león	Argemona mexicana	Maíz: 2,50 - 3,5 L/ha (1,50 - 2,1 L/mz).	60 días.	24 horas.
Verdolaga	Taraxacum oficinale			
Bledo	Portulaca oleracea	Caña de azúcar, pastos y cespedes: 2,55 - 4,00 L/Ha (1,78 - 2,8 L/mz).	60 días.	24 horas.
Canutillo	Amaranthus sp			
Margarita	Commelina diffusa			
Flor amarilla	Bidens pilosa			
Santa Lucía	Melampodium divaricatum			
Mostaza salvaje	Ageratum conyzoides			
Cañilo de Mazorca	Sinapsis arvensis			
	Acalypha acalopecurus			

*Intervalo entre la última aplicación y cosecha **Intervalo de réingreso

Cultivo:

Maíz



Pastos




Caña de azúcar



Arroz



Cultivos autorizados: Maíz, pasto, caña de azúcar, arroz.



**Amigo agricultor,
CUIDA TU SALUD, COMO
CUIDAS TU CULTIVO.**



Instrucciones de uso



Instrucciones de manejo:

pH ÓPTIMO DEL AGUA: 4-5.5

FITOTOXICIDAD: Es fitotóxico para cultivos cuyo uso no se recomienda en esta etiqueta. No aplique cerca de plantas de algodón porque es extremadamente susceptible al herbicida.

COMPATIBILIDAD: Este producto es compatible con Paraquat Alemán® 20 SL, Angluron® 30 SL e Igual®. Es incompatible con fertilizantes solubles o con soluciones diluidas que contengan iones de metales pesados o muy alcalinos.

ÉPOCA DE APLICACIÓN: Arroz: La aplicación debe efectuarse después del amacollamiento, pero antes de que se inicie la floración. Maíz: No se debe efectuar aplicaciones post-emergentes en suelos arenosos, cuando el maíz tiene una altura de 24 cms, ni tampoco cuando se cultiva para la producción de semilla híbrida. Caña de azúcar, pastos y céspedes: Las leguminosas y forrajeras pueden ser dañadas por el herbicida especialmente si se aplica cuando la temperatura es elevada. No permitir que los animales se alimenten del pasto durante tres semanas después del tratamiento.


PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Con el tanque del equipo de aplicación lleno a la mitad con agua agregue la dosis recomendada del producto, luego complete el agua faltante, agite la mezcla para mantener la homogeneización. Utilice presión baja y aplíquelo cuando tenga crecimiento activo la maleza. Durante la aplicación y preparación de la mezcla utilice overol, guantes, botas de hule, mascarilla y anteojos protectores. Asegúrese de contar con el equipo auxiliar como dosificador, cubetas graduadas, paletas de agitación, cepillo y brocha para limpiar el equipo tapado.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Al aplicar Elimina® 60 SL debe asegurarse que el equipo de aplicación y sus boquillas estén en buen estado y debidamente calibrados con agua. Utilice un equipo de aplicación que le asegure un buen cubrimiento de la superficie a aplicar. La aplicación de este producto puede realizarse con equipo terrestre, o tracción mecánica, tipo parihuela y mochila. El tipo de boquilla recomendable a usar es de abanico.



Herbicidas

Recomendación Técnica:



Clic aquí:



(+502) 3764-5454

ACTUALIZACIÓN DE DATOS • 2026



agrocentro®

Agricultura Próspera y Sostenible para Todos



(+504) 2251-2300



AgrocentroHonduras



www.agrocentro.com