



HN



Herbicidas



Descripción del producto:

Elimina® 72 SL
Herbicida, Fenoxi, 2,4-D.

COMPOSICIÓN: Este producto contiene 720 gramos de 2,4-D por cada litro de producto comercial.

MODO DE ACCIÓN: es un herbicida sistémico post-emergente a las malezas de hoja ancha, el cual es rápidamente absorbido por el follaje de las malezas.



RECOMENDACIÓN

VER PANFLETO

MECANISMO DE ACCIÓN: Interfiere en el metabolismo de los ácidos nucleicos. Actúa como auxina sintética e inhibe el crecimiento. Se absorbe por hojas y raíces luego se trasloca por el floema y xilema y se acumula en los meristemas

Presentaciones:

500 mL

1 L

3.5 L

18 L

200 L

Principales malezas



Melampodium
divaricatum



Portulaca oleracea



Amaranthus spp.



Bidens pilosa



Commelina diffusa

Maleza		Dosis	I.A.C*	I.R**
Nombre	Nombre científico			
Tomatillo Malva silvestre	<i>Solanum americanum</i>	Arroz: 3,83 - 6 L/ha (2,68 - 4,2 L/mz).	60 días.	24 horas.
Cardo santa	<i>Malva parviflora</i>			
Diente de león	<i>Argemona mexicana</i>			
Verdolaga	<i>Taraxacum officinale</i>	Maíz: 3,75 - 5,25 L/ha (2,63 - 3,68 L/mz).		
Bledo	<i>Portulaca oleracea</i>			
Canutillo	<i>Amaranthus sp</i>			
Margarita	<i>Commelina diffusa</i>	Caña de azúcar y pastos: 3,83 - 6,00 L/Ha (2,68 - 4,20 L/mz)		
Flor amarilla	<i>Bidens pilosa</i>			
Santa Lucía	<i>Melampodium divaricatum</i>			
Mostaza salvaje	<i>Ageratum conyzoides</i>			
Caño de Mazorca	<i>Sinapsis arvensis</i>			
	<i>Acalypha acalopecurus</i>			

*Intervalo entre la última aplicación y cosecha **Intervalo de réingreso

Cultivo:

Maíz



Pastos




Caña de azúcar



Arroz



Cultivos autorizados: Maíz, pasto, caña de azúcar, arroz.



**Amigo agricultor,
CUIDA TU SALUD, COMO
CUIDAS TU CULTIVO.**



Instrucciones de uso



Instrucciones de manejo:

pH ÓPTIMO DEL AGUA: 4-5.5

FITOTOXICIDAD: Es fitotóxico para cultivos cuyo uso no se recomienda en esta etiqueta. No aplique cerca de plantas de algodón porque es extremadamente susceptible al herbicida.

COMPATIBILIDAD: Este producto es compatible con Paraquat Alemán® 20 SL, Angluron® 30 SL e Igual®. Es incompatible con fertilizantes solubles o con soluciones diluidas que contengan iones de metales pesados o muy alcalinos.

ÉPOCA DE APLICACIÓN: Arroz: La aplicación debe efectuarse después del amallamiento, pero antes de que se inicie la floración. Maíz: No se debe efectuar aplicaciones post-emergentes en suelos arenosos, cuando el maíz tiene una altura de 24 cms, ni tampoco cuando se cultiva para la producción de semilla híbrida. Caña de azúcar, pastos y céspedes: Las leguminosas y forrajeras pueden ser dañadas por el herbicida especialmente si se aplica cuando la temperatura es elevada. No permitir que los animales se alimenten del pasto durante tres semanas después del tratamiento.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Con el tanque del equipo de aplicación lleno a la mitad con agua agregue la dosis recomendada del producto, luego complete el agua faltante, agite la mezcla para mantener la homogeneización. Utilice presión baja y aplíquelo cuando tenga crecimiento activo la maleza. Durante la aplicación y preparación de la mezcla utilice overol, guantes, botas de hule, mascarilla y anteojos protectores. Asegúrese de contar con el equipo auxiliar como dosificador, cubetas graduadas, paletas de agitación, cepillo y brocha para limpiar el equipo tapado.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Al aplicar Elimina® 72 SL debe asegurarse que el equipo de aplicación y sus boquillas estén en buen estado y debidamente calibrados con agua. Utilice un equipo de aplicación que le asegure un buen cubrimiento de la superficie a aplicar. La aplicación de este producto puede realizarse con equipo terrestre, o tracción mecánica, tipo parihuela y mochila. El tipo de boquilla recomendable a usar es de abanico.



Herbidas

Recomendación Técnica:

Clic aquí:



(+502) 3764-5454

ACTUALIZACIÓN DE DATOS • 2026



agrocentro®

Agricultura Próspera y Sostenible para Todos



(+504) 2251-2300



AgrocentroHonduras



www.agrocentro.com