



HN



Descripción del producto:

Feroz® 16,5 SL

Herbicida, sistémico

COMPOSICIÓN: 165 gramos de 2,4-D + Picloram por cada litro de producto comercial.

MODO DE ACCIÓN: Es un herbicida hormonal sistémico, para el control de malezas de hoja ancha, los ingredientes activos interfieren en la síntesis de ácidos nucleicos. Afectando el crecimiento de las malezas.

RECOMENDACIÓN



VER PANFLETO

MECANISMO DE ACCIÓN: Provoca pérdida del crecimiento por atrofia de los haces vasculares, produciendo la muerte de la planta. 2,4 D: Interfiere en el metabolismo de los ácidos nucleicos actúa como auxina sintética e inhibe el crecimiento se absorbe por hojas y raíces, luego se trasloca por xilema y floema, acumulándose en los meristemos. Picloram: Se absorbe rápidamente por raíces y hojas, trasladándose en los meristemos. Regula el crecimiento de las malezas imitando la auxina sintética o el ácido sintético o el ácido indolacético.

Presentaciones:

1 L

3.5 L

18 L

Principales malezas



Sida acuta



Amaranthus spinosus



Portulaca oleracea



Asclepia curassavica



Ipomoea spp.

Maleza		Dosis	I.A.C*	I.R**
Nombre	Nombre científico			
Tomatillo	Solanum americanum	Caña de azúcar, maíz y arroz: 3,0 L/Ha en 200 L de agua (2.1L/Mz en 140 L de agua).	Arroz, Maíz y Caña de azúcar: 60 días Pastos: 30 días.	Después de 24 horas de haber asperjado el producto.
Malva silvestre	Malva parviflora			
Cardo santa	Argemone mexicana	Pastos: 4.29 L/ha en 160 litros de agua (3 L/Mz en 112 litros de agua, por manzana).		
Diente de león	Taraxacum officinale			
Verdolaga	Portulaca oleracea			
Bledo	Amaranthus sp			
Canutillo	Commelina diffusa			
Margarita	Bidens pilosa			
Flor amarilla	Melampodium divaricatum			
Santa Lucía	Ageratum conyzoides			
Mostaza salvaje	Sinapsis arvensis			
Caillo de Mazorca	Acalypha acalopecurus			

Cultivo:

Maíz



Pastos



Banano



Caña de azúcar



Arroz



Cultivos autorizados: Maíz, pasto, bananos, caña de azúcar, arroz.



**Amigo agricultor,
CUIDA TU SALUD, COMO
CUIDAS TU CULTIVO.**



Instrucciones de uso



Instrucciones de manejo:

pH ÓPTIMO DEL AGUA: 4-5.5

FITOTOXICIDAD: Es fitotóxico en cultivos anuales y perennes de hoja ancha.

COMPATIBILIDAD: Feroz 16,5 SL por ser un herbicida no selectivo a malezas de hojas anchas y hormonal de contacto, el cuál es absorbido por el follaje de las malezas es compatible con propanil, atrazina, ametrina, diuron y paraquat. Incompatible con productos derivados del petróleo o productos muy ácidos o alcalinos.

ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar el producto cuando las malezas se encuentren metabólicamente activas entre 0.1 a 0.5 metros de alto o cuando la maleza tenga de 3 a 4 hojas formadas.

Caña de azúcar: Pre o post emergencia antes de que cierre el cultivo. Pastos: Realizar la aplicación cuando la maleza objetivo tenga entre 10 y 50 centímetros de altura, para obtener mejores resultados. Arroz: Pulverizar desde el comienzo del macollaje. Maíz: pre-emergencia del cultivo.

Por lo general con una aplicación es suficiente en los cultivos antes mencionados.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: En tanque de aspersora, conteniendo agua hasta la mitad, verifique cual es el pH de su fuente de agua, puede hacerlo utilizando tiras indicadoras de pH. Un pH de 5 es el recomendado para este producto. Si es necesario realizar alguna corrección hágalo empleando alguno de los coadyuvantes que se comercializa como reguladores de pH. Vierta la dosis recomendada de FERROZ 16,5 SL y complete con el volumen de agua requerido.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Se recomienda usar aspersora de mochila, equipo accionado por tractor. Asegúrese que el equipo de aspersión esté en buenas condiciones de funcionamiento, libre de derrames, filtros limpios, dosificador, boquillas de abanico 8003 ó 8004, debidamente calibrado.



Herbicidas

Recomendación Técnica:



Clic aquí:  **(+502) 3764-5454**

ACTUALIZACIÓN DE DATOS • 2026



(+504) 2251-2300



AgrocentroHonduras



www.agrocentro.com

Agricultura Próspera y Sostenible para Todos