



HN



Herbicidas



agrocentro®

Agricultura Próspera y Sostenible para Todos



Descripción del producto:

Fúriko® 20 SL

Herbicida, Bipiridilo, Paraquat.

COMPOSICIÓN: Este producto contiene 200 gramos de Paraquat en un litro de producto comercial.

MODO DE ACCIÓN: Este producto es un herbicida sistémico, es absorbido principalmente por medio de las raíces, se trasloca vía xilema Inhibiendo el proceso fotosintético. Aplicado al suelo actúa como post-emergente de malezas gramíneas y de hoja ancha.

RECOMENDACIÓN



VER PANFLETO

MECANISMO DE ACCIÓN: En general se da un cambio en la secuencia de aminoácidos, serina por glicina, lo que conlleva a la destrucción por fotooxidación de los carotenoides, por lo tanto, de la clorofila, interfiriendo en la reacción de Hill, del transporte de electrones en el fotosistema I ó II.

Presentaciones:

500 mL

1 L

3.5 L

18 L

200 L

Principales malezas



Rottboellia
cochinchinensis



Cenchrus echinatus



Cyperus spp.



Leptochloa filiformis



Panicum fasciculatum

Maleza		Dosis	I.A.C*	I.R**
Nombre	Nombre científico			
Salea	<i>Digitaria sanguinalis</i>	Se recomienda aplicar 3 litros de Fúriko® 20 SL por hectárea (2 litros por manzana); por aspersora de mochila de 16 litros de agua, la dosis a utilizar son 100 a 125 mL (4 a 5 medidas de 25 mL), cuando las malezas no tengan más de 15 cm de alto o bien tengan de 3 a 4 hojas formadas.	Cero días: Maíz, Sorgo, Frijol, Caña de Azúcar, Arroz, Papa, Banano, Plátano, Café, Cítricos, Hule, Palma africana, Manzana y Pera. Catorce días: Melón, Pepino y Sandía.	1 hora.
Mozote	<i>Cenchrus echinatus</i>			
Zacate de agua	<i>Ixophorus sp</i>			
Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>			
Plumilla	<i>Leptochloa filiformis</i>			
Arrocillo	<i>Echinochloa crus-galli</i>			
Coyolillo	<i>Cyperus ferax</i>			
Caminadora	<i>Rottboellia cochinchinensis</i>			
Bermuda	<i>Cynodon dactylon</i>			
Zacate Jhonson	<i>Sorghum halepense</i>			
Bledo	<i>Amaranthus sp</i>			
Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>			
Margarita	<i>Bidens pilosa</i>			
Hierba de pollo	<i>Commelina diffusa</i>			
Pica pica	<i>Fleurya spp</i>			
Rabo de gato	<i>Acalypha acalopercurus</i>			
Altemisa	<i>Artemisia vulgaris</i>			
Cenizo	<i>Chenopodium sp.</i>			
Papacuyo	<i>Galinsoga parviflora</i>			
Golondrina	<i>Euphorbia hirta</i>			
Cola de zorro	<i>Panicum fasciculatum</i>			
Bejuco	<i>Vigna vesiculata</i>			
Flor amarilla	<i>Melampodium divaricatum</i>			
Tomatillo	<i>Solanum nigrum</i>			
Gramilla	<i>Chloris sp.</i>			
Caña brava	<i>Paspalum paniculatum</i>			
Camalote	<i>Paspalum conjugatum</i>			

*Intervalo entre la última aplicación y cosecha **Intervalo de réingreso

Cultivo:

Maíz



Café



Banano y plátano



Palma Africana



Cítricos



Cultivos autorizados: Maíz, café, palma africana, cítricos, banano y plátano



**Amigo agricultor,
CUIDA TU SALUD, COMO
CUIDAS TU CULTIVO.**



Instrucciones de uso



Instrucciones de manejo:

pH ÓPTIMO DEL AGUA: 5 – 6.5

FITOTOXICIDAD: Es fitotóxico a todos los tejidos verdes, por lo que la aplicación, debe ser dirigida y evitarse la aspersión de los cultivos.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de herbicidas comúnmente utilizados en los cultivos. Evite mezclar con coadyuvantes, ya que se reduce su eficacia.

ÉPOCA DE APLICACIÓN: Dependerá de la incidencia de malezas en los cultivos. Para melón, sandía y pepino, se recomienda asperjar pre-siembra o pre-emergente al cultivo, hasta los 25 días de siembra.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Vierta la dosis requerida de Fúriko® 20 SL en el tanque de aplicación, conteniendo agua limpia hasta la mitad, agite la mezcla y complete el volumen de agua requerido. Asegúrese de contar con dosificadores o medidores para líquidos, cubetas graduadas, paleta de agitación, cepillo para limpiar las boquillas, en cualquier caso, nunca limpie las boquillas con la boca. Debe usar el equipo de protección personal consistente en: botas, mascarilla, anteojos y guantes.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Al aplicar Fúriko® 20 SL, debe usarse guantes, botas, mascarilla, anteojos y overol de mangas largas. Se recomienda usar aspersora de mochila o equipo accionado por tractor. Deberá asegurarse que el equipo de aspersión esté en buenas condiciones de funcionamiento, libre de derrames, filtros limpios, dosificador, boquillas de abanico 8002-8004 o su equivalente debidamente calibrado, una presión de 20 a 30 libras por pulgada cuadrada y un volumen de agua de 325 a 570 litros de agua por hectárea (228 a 400 litros de agua por manzana). Después de usar Fúriko® 20 SL se recomienda lavar con suficiente agua y jabón el equipo de aspersión y dejarlo secar.

Fúriko



Herbicidas

Recomendación Técnica:

Clic aquí:



(+502) 3764-5454

ACTUALIZACIÓN DE DATOS • 2026



agrocentro®

Agricultura Próspera y Sostenible para Todos



(+504) 2251-2300



AgrocentroHonduras



www.agrocentro.com