

Glifosato Alemán

HN



Descripción del producto:

Glifosato® 36,5 SL

Fosfonico

COMPOSICIÓN: Este producto contiene 365 gramos de glifosato por cada litro de producto comercial.

MODO DE ACCIÓN: Es un herbicida no selectivo sistémico, el cual es absorbido por el follaje de las malezas de hoja ancha y gramíneas con una rápida traslocación por el floema hacia los meristemas de la planta. No persiste en el suelo y no tiene actividad preemergente después de cinco días de haberse asperjado se aprecia el color amarillento que tienen las malezas.

RECOMENDACIÓN

VER PANFLETO



MECANISMO DE ACCIÓN: Su principal mecanismo de acción en plantas y varios microorganismos es inhibir la actividad de la 5-enolpiruvil shikimato3-fosfato sintetasa, una enzima de la vía metabólica del shikimato para la biosíntesis de corismato, precursor de una amplia variedad de metabolitos aromáticos de las plantas.

Presentaciones:

1 L

3.5 L

20 L

200 L

Principales malezas



Leptochloa filiformis



Cinodon dactylon



Ixophorus spp.



Euphorbia sp



Chenopodium spp

Maleza		Dosis	I.A.C*	I.R**
Nombre	Nombre científico			
Salea Zacate Para Brachiaria mutica.	Digitaria sanguinalis	Se recomienda aplicar 3 litros de producto formulado por hectárea cuando las malezas no tengan más de 15 cm de altura o bien tengan de 3 a 4 hojas formadas.	28 días en café únicamente.	1 hora.
Mozote	Cenchrus echinatus.			
Hierbabuena	Metacarpus sp.	Como madurante para caña de azúcar: Asperjar 5 a 10 semanas antes de la cosecha, dependiendo el tipo de suelo se recomienda una dosis de 0,75 - 1,5 L/ha (0,5 - 1,0 L/mz).		
Zacate de agua	Ixophorus sp.			
Lechuguilla	Sonchus sp.			
Pata de gallina	Eleusine indica.			
Plumilla	Leptochloa filiformis.			
Margarita	Bidens pilosa.			
Pacuyuyo	Galinsoga parviflora			
Hierba del gallinazo	Chenopodium sp.			
Zacae	Jhonson Sorghum halepense.			
Coyolillo,	Cyperus ferax			
Lechosa,	Euphorbia sp			
Bermuda	Cinodon dactylon			
Gramma antena	Paspalum conjugatum			
Bledo	Amaranthus spp.			
Campanilla	Ipomoea sp.			
Verdolaga	Portulaca oleracea			
Arrocillo	Echinochloa crusgalli.			
Zacate de agua	Ixophorus sp.			
Hierba de pollo	Commelina diffusa			
Tomatillo	Solanum nigrum.			
Kikuyo	Pennisetum clandestinum.			
Zacate estrella	Cynodon plectostachius.			
Flor amarilla	Melampodium divaricatum			

*Intervalo entre la última aplicación y cosecha **Intervalo de réingresso

Cultivo:

Maíz



Café



Banano y plátano



Caña de azúcar



Arroz



Cultivos autorizados: Aguacate, café, macadamia, banano, plátano, cítricos, palma africana, caña de azúcar, hule, soya, maíz, sorgo, arroz, trigo, cebada, avena, mombasa, papaya, melón, sandía, pepino, ayote, calabacín, guicoy, calabaza, guisquil.



**Amigo agricultor,
CUIDA TU SALUD, COMO
CUIDAS TU CULTIVO.**



Instrucciones de uso



Instrucciones de manejo:

pH ÓPTIMO DEL AGUA: 3-6

FITOTOXICIDAD: Es fitotóxico a todos los tejidos verdes, por lo que la aplicación debe ser dirigida y evitarse la aspersión de los cultivos.

COMPATIBILIDAD: No se recomienda mezclar con otros herbicidas.

ÉPOCA DE APLICACIÓN: Dependerá de la incidencia de malezas en los cultivos. Para melón, sandía y pepino, se recomienda asperjar a la maleza dos a tres semanas antes de la pre-siembra o pre-emergencia al cultivo.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Vierta la dosis requerida de Glifosato Alemán® 35,6 SL en el tanque de aplicación conteniendo agua limpia hasta la mitad, complete el volumen de agua requerido. Asegúrese de contar con dosificadores o medidores para sólidos, paleta de agitación, cepillo para limpiar las boquillas, en cualquier caso nunca limpie las boquillas con la boca. Debe usar el equipo de protección personal mínimo consistente en botas, mascarilla, anteojos y guantes.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Debe usarse guantes, botas, mascarilla, anteojos y overol de mangas largas. Se recomienda usar aspersora de mochila o equipo accionado por tractor. Deberá asegurarse que el equipo de aspersión esté en buenas condiciones de funcionamiento, libre de derrames, filtros limpios, dosificador, boquillas de abanico plano TJ-800050 hasta TJ-8002. Para asperjar en bandas se recomienda boquillas de inundación tipo Flogjet, de espuma o antideriva y un volumen de agua de hasta 60 hasta 600 litros de agua por hectárea (42 a 420 litros de agua por manzana). Para aspersiones aéreas se recomienda volúmenes de 25 a 50 litros por hectárea (17,5 a 35 litros de agua por manzana) con gotas grandes (300 a 500 micras) la altura de vuelo no debe ser mayor a 3 m, la velocidad del viento menor a 5 km/hr, la humedad relativa mayor del 80% y la temperatura ambiental menor de 28° C.

Glifosato Alemán



Herbicidas

Recomendación Técnica:

Clic aquí:



ACTUALIZACIÓN DE DATOS • 2026



agrocentro®

Agricultura Próspera y Sostenible para Todos



(+504) 2251-2300



AgrocentroHonduras



www.agrocentro.com