

Konflikt

HN



Herbidas

agrocentro
Agricultura Próspera y Sostenible para Todos



Descripción del producto:

Konflikt® 30,4 SL

Herbicida, Fenoxi, Piridina

COMPOSICIÓN: Este producto contiene 24 gramos de 2,4-D y 6,4 g de Picloram por cada 100 ml. de producto.

MODO DE ACCIÓN: Es un herbicida sistémico, absorbido rápidamente por raíces y hojas y traslocado, acumulándose en los meristemos.



RECOMENDACIÓN

VER PANFLETO

MECANISMO DE ACCIÓN: Los ingredientes activos interfieren la síntesis de ácidos nucleicos, por lo consiguiente ocasiona pérdida del crecimiento por atrofia de los haces vasculares, produciendo la muerte de la planta.

Presentaciones:

1 L

3.5 L

18 L

Principales malezas



Asclepia curassavica



Mimosa pudica



Genira americana



Acacia cornigera



Lantana camara

Maleza		Dosis	I.A.C*	I.R**
Nombre	Nombre científico			
Viborana	<i>Asclepia curassavica</i>	Pastos y Maíz: 2.15 - 3.58 L/ha en 160 litros de agua. (1,50 - 2.50 L/mz en 112 litros de agua, por manzana).	Maíz: 60 días. Pastos: 30 días.	Después que la mezcla con el producto se haya secado en el follaje del cultivo tratado; aproximadamente 24 horas.
Cinco negritos	<i>Lantana camara</i>			
Zarza de playa	<i>Mimosa pigra</i>	Observaciones: Aplicar el producto cuando las malezas se encuentren metabólicamente activas entre 0.1 a 0.5 metros de altura o cuando la melaza tenga de 3 a 4 hojas formadas.		
Zarza dormilona	<i>Mimosa pudica</i>			
Huevo de chucho	<i>Ahouai nitida</i>			
Irayol	<i>Genira americana</i>			
Ixcanal	<i>Acacia cornigera</i>			
Guachimol	<i>Pithecellobium lanceolatum</i>			

Cultivo:


Maíz



Pastos



Cultivos autorizados: Pastos, maíz.



**Amigo agricultor,
CUIDA TU SALUD, COMO
CUIDAS TU CULTIVO.**



Instrucciones de uso



Instrucciones de manejo:

pH ÓPTIMO DEL AGUA: 5 - 7

FITOTOXICIDAD: No presenta fitotoxicidad a las dosis recomendadas.

COMPATIBILIDAD: Konflikt 30, 4 SL es compatible con propanil, atrazina, ametrina, diuron y paraquat.

ÉPOCA DE APLICACIÓN: Por lo general con una aplicación es suficiente en los cultivos antes mencionados.

Pastos: Se recomienda realizar la aplicación del producto sobre malezas metabólicamente activas que tengan una altura comprendida entre 10 y 50 centímetros de altura para obtener mejores resultados.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Verter agua limpia en el tanque de aplicación, seguidamente se agrega la dosis requerida de Konflikt 30,4 SL agitando la mezcla, completar con agua el tanque de mezcla. Verifique el pH de su fuente de agua, puede hacerlo por medio de tiras indicadoras de pH, este producto funciona mejor en un pH de 5, de ser necesario realice correcciones. Asegúrese de contar con medidores para líquidos, cubetas graduadas, paletas de agitación, cepillo para limpiar las boquillas.

Después de usar este producto, se recomienda lavar con suficiente agua y jabón el equipo de aspersión y dejarlo secar.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Al aplicar Konflikt 30,4 SL, debe usarse guantes, botas de hule, mascarilla, anteojos y overol de manga larga. Se recomienda usar aspersora de mochila, equipo accionado por tractor. Asegurese que el equipo de aspersión esté en buenas condiciones de funcionamiento, libre de derrames, filtros limpios, dosificador, boquillas de abanico 8003 ó 8004 o su equivalente, debidamente calibrado y a una presión de 20 a 30 libras por pulgada cuadrada.

Konflikt



Herbicidas

Recomendación Técnica:



Clic aquí:  **(+502) 3764-5454**

ACTUALIZACIÓN DE DATOS • 2026



agrocentro®

Agricultura Próspera y Sostenible para Todos



(+504) 2251-2300



AgrocentroHonduras



www.agrocentro.com