



HN



Descripción del producto:

Kung fu® 2,5 EC

Insecticida, Piretroide

COMPOSICIÓN: Este producto contiene 25 gramos de Lambdacialotrina por cada litro de producto comercial.

MODO DE ACCIÓN: KUNG FU 2,5 EC es un insecticida de contacto e ingestión, presentando además un buen efecto residual, actúa sobre el sistema nervioso del insecto, provocando hiperexcitación, convulsiones, parálisis y finalmente su muerte.

RECOMENDACIÓN



VER PANFLETO

MECANISMO DE ACCIÓN: Produce el bloqueo de la conducción de los estímulos nerviosos al modificar el movimiento de los iones de sodio, afectando así la permeabilidad de las membranas de las células nerviosas.

Presentaciones:

125 mL

250 mL

500 mL

1 L

Principales plagas que controla



Bemisia tabaci



Frankliniella occidentalis



Tetranychus urticae



Plutella xylostella



Anthonomus eugeni

Plagas		Dosis	I.A.C*	I.R**
Nombre	Nombre científico			
Gusano cogollero	<i>Spodoptera spp</i>	350 - 500 mL/ha (245 - 350 mL/ manzana o 25 - 35 mL por bomba de 16 litros). Realiza la primera aplicación al observar la presencia de los primeros insectos en el cultivo.	Un día: Arroz, frijol, arveja, chile, papa, tomate, sorgo, soya, brócoli, repollo, lechuga, coliflor. Tres días: Melón, sandía, maíz. Catorce días: Cebolla y ajo. No aplica: Palma africana.	24 horas después de la aplicación.
Mosca midge	<i>Contarinia sorghicola</i>			
Picudo de la vaina del Frijol	<i>Apion godmani</i>			
Tortuguilla	<i>Diabrotica spp</i>			
Gusano diamante	<i>Plutella xylostella</i>			
Mariposa blanca	<i>Pieris spp</i>			
Gusano del fruto	<i>Heliothis spp</i>			
Piojillo de la cebolla	<i>Thrips spp</i>			
Chinche de la espiga del arroz	<i>Lissorhoptrus oryzophilus</i>			
Chicharrita	<i>Empoasca spp</i>			
Minador	<i>Liriomyza spp</i>			
Falso medidor	<i>Trichoplusia ni</i>			
Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>			
Picudo del Chile	<i>Anthonomus eugeni</i>			
Tortuguilla	<i>Diabrotica spp</i>			
Sogata	<i>Sogatodes oryzicola</i>			
Chinche de la espiga del arroz	<i>Alkindus sp</i>			
Gusano del melón	<i>Diaphania spp</i>			

*Intervalo entre la última aplicación y cosecha **Intervalo de reingreso

Cultivo:

Tomate



Cucurbitas



Maíz



Palma Africana



Coles



Cultivos autorizados: Maíz, sorgo, tomate, papa, brócoli, repollo, coliflor, lechuga, maní, chile, ají, pimiento, frijol, ajonjolí, arveja, cebolla, ajo, arroz, melón, sandía, soya, palma africana.

**Amigo agricultor,
CUIDA TU SALUD, COMO
CUIDAS TU CULTIVO.**



Instrucciones de uso



Instrucciones de manejo:

pH ÓPTIMO DEL AGUA: 5-6

FITOTOXICIDAD: No presenta fitotoxicidad a las dosis y cultivos recomendados.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de los productos agrícolas; no compatible con productos alcalinos.

ÉPOCA DE APLICACIÓN: Realiza la primera aplicación al observar la presencia de los primeros insectos en el cultivo. Dependerá de la dinámica poblacional del insecto plaga. El intervalo puede variar de cada 3 a 8 días, o bien al observarse la presencia de los primeros insectos en el cultivo. En palma africana se recomienda aplicar, dependiendo incidencia de larvas; regularmente son de 5 a 7 aplicaciones al año.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Póngase el equipo de protección personal, antes de usar y manipular KUNG FU 2,5 EC. Como con todos los productos químicos, evite en lo posible el contacto con la solución. No comer, beber o fumar durante el manejo y aplicación de este producto. De acuerdo con la dosis a utilizar, mézclelo en el tanque de la aspersora o tonel con agua limpia hasta la mitad. Verifique cual es el pH de su fuente de agua, para lo que puede utilizar tiras indicadoras de pH. Un pH en un rango de 5-6 es el recomendado para la mayoría de aplicaciones de pesticidas. Si es necesario puede corregir el pH utilizando alguno de los coadyuvantes que se vende como reguladores de pH. Vierta la dosis requerida, agitar y completar el volumen de agua requerido. Agite para obtener una mezcla homogénea antes de comenzar la aspersión. Se recomienda una presión de 20 a 40 libras por pulgada cuadrada y un volumen de 285-570 litros de agua por hectárea (200-400 litros de agua por manzana).

EQUIPO DE APLICACIÓN: Aspersora de mochila o equipo accionado por tractor. Antes de utilizar el equipo de aspersión, revise cuidadosamente que esté en buen estado de funcionamiento. Antes de aplicar KUNG FU 2,5 EC calibre el equipo terrestre con agua para verificar que está aplicando la dosis correcta. Con equipo terrestre se recomienda usar boquillas de cono hueco. Después de la aplicación, lave el equipo de aspersión con agua y jabón, deje secarlo y guárdelo. Utilice el equipo de protección personal antes de utilizar y manipular KUNG FU 2,5 EC.



KUNG FU



Insecticida

Recomendación Técnica:

Clic aquí:



ACTUALIZACIÓN DE DATOS • 2026



agrocentro®
Agricultura Próspera y Sostenible para Todos



(+504) 2251-2300



AgrocentroHonduras



www.agrocentro.com