

Licosato[®]

35,6 SL

HN



Herbicidas



Descripción del producto:

Licosato[®] 36,5 SL

Organofosfónicos

COMPOSICIÓN: Este producto contiene 365 gramos de glifosato por cada litro de producto comercial.

MODO DE ACCIÓN: Es un herbicida no selectivo sistémico, el cual es absorbido por el follaje de las malezas de hoja ancha y gramíneas con una rápida traslocación por el floema hacia los meristemas de la planta. No persiste en el suelo y no tiene actividad preemergente después de cinco días de haberse asperjado se aprecia el color amarillento que tienen las malezas.

RECOMENDACIÓN

VER PANFLETO



MECANISMO DE ACCIÓN: Su principal mecanismo de acción en plantas y varios microorganismos es inhibir la actividad de la 5-enolpiruvil shikimato3-fosfato sintetasa, una enzima de la vía metabólica del shikimato para la biosíntesis de corismato, precursor de una amplia variedad de metabolitos aromáticos de las plantas.

Presentaciones:

1 L

3.5 L

20 L

200 L

Principales malezas



Leptochloa filiformis



Cinodon dactylon



Ixophorus spp.



Euphorbia sp.



Chenopodium spp.

Maleza		Dosis	I.A.C*	I.R**
Nombre Salea Zacate Para Brachiaria mutica. Mozote Hierbabuena Zacate de agua Lechuguilla Pata de gallina Plumilla Margarita Pacuyuyo Hierba del gallinazo Zaca Coyolillo, Lechosa, Bermuda Grama antena Bledo Campanilla Verdolaga Arrocillo Zacate de agua Hierba de pollo Tomatillo Kikuyo Zacate estrella Flor amarilla	Nombre científico Digitaria sanguinalis Cenchrus echinatus. Metracarpus sp. Ixophorus sp. Sonchus sp. Eleusine indica. Leptochloa filiformis. Bidens pilosa. Galinsoga parviflora Chenopodium sp. Jhonson Sorghum halepense. Cyperus ferax Euphorbia sp Cinodon dactylon Paspalum conjugatum Amaranthus spp. Ipomoea sp. Portulaca oleracea Echinochloa crusgalli. Ixophorus sp. Commelina diffusa Solanum nigrum. Pennisetum clandestinum. Cynodon plectostachius. Melampodium divaricatum	Se recomienda aplicar 3 litros de producto formulado por hectárea cuando las malezas no tengan más de 15 cm de altura o bien tengan de 3 a 4 hojas formadas. Como madurante para caña de azúcar: Asperjar 5 a 10 semanas antes de la cosecha, dependiendo el tipo de suelo se recomienda una dosis de 0,75 - 1,5 L/ha (0,5 - 1,0 L/mz).	28 días en café únicamente.	1 hora.

*Intervalo entre la última aplicación y cosecha **Intervalo de réingreso

Cultivo:

Maíz



Café



Banano y plátano



Caña de azúcar




Arroz



Cultivos autorizados: Aguacate, café, macadamia, banano, plátano, cítricos, palma africana, caña de azúcar, hule, soya, maíz, sorgo, arroz, trigo, cebada, avena, mombasa, papaya, melón, sandía, pepino, ayote, calabacín, guicoy, calabaza, guisquil



**Amigo agricultor,
CUIDA TU SALUD, COMO
CUIDAS TU CULTIVO.**



Instrucciones de uso



Instrucciones de manejo:

pH ÓPTIMO DEL AGUA: 3-6

FITOTOXICIDAD: Es fitotóxico a todos los tejidos verdes, por lo que la aplicación debe ser dirigida y evitarse la aspersión de los cultivos.

COMPATIBILIDAD: No se recomienda mezclar con otros herbicidas.

ÉPOCA DE APLICACIÓN: Dependerá de la incidencia de malezas en los cultivos. Para melón, sandía y pepino, se recomienda asperjar a la maleza dos a tres semanas antes de la pre-siembra o pre-emergencia al cultivo.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Vierta la dosis requerida de Licosato® 35,6 SL en el tanque de aplicación conteniendo agua limpia hasta la mitad, complete el volumen de agua requerido. Asegúrese de contar con dosificadores o medidores para sólidos, paleta de agitación, cepillo para limpiar las boquillas, en cualquier caso nunca limpie las boquillas con la boca. Debe usar el equipo de protección personal mínimo consistente en botas, mascarilla, anteojos y guantes.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Debe usarse guantes, botas, mascarilla, anteojos y overol de mangas largas. Se recomienda usar aspersora de mochila o equipo accionado por tractor. Deberá asegurarse que el equipo de aspersión esté en buenas condiciones de funcionamiento, libre de derrames, filtros limpios, dosificador, boquillas de abanico plano TJ-800050 hasta TJ-8002. Para asperjar en bandas se recomienda boquillas de inundación tipo Flogjet, de espuma o antideriva y un volumen de agua de hasta 60 hasta 600 litros de agua por hectárea (42 a 420 litros de agua por manzana). Para aspersiones aéreas se recomienda volúmenes de 25 a 50 litros por hectárea (17,5 a 35 litros de agua por manzana) con gotas grandes (300 a 500 micras) la altura de vuelo no debe ser mayor a 3 m, la velocidad del viento menor a 5 km/hr, la humedad relativa mayor del 80% y la temperatura ambiental menor de 28° C.

Licosato
35,6 SL



Herbicidas

Recomendación Técnica:



Clic aquí:  **(+502) 3764-5454**

ACTUALIZACIÓN DE DATOS • 2026


agrocentro[®]
Agricultura Próspera y Sostenible para Todos



(+504) 2251-2300



AgrocentroHonduras



www.agrocentro.com