



HN



Herbicidas



agrocentro®

Agricultura Próspera y Sostenible para Todos

Descripción del producto:

Pikette® 60 WG

Sulfonilurea



COMPOSICIÓN: Este producto contiene 600 gramos de Metsulfuron metyl por cada Kg de producto comercial.

MODO DE ACCIÓN: Es un herbicida de acción sistémica para uso agrícola en aplicaciones post-emergentes, siendo absorbido por las raíces y follaje con un rápida traslocación o movimiento acropetálico y basipetálico.

RECOMENDACIÓN



VER PANFLETO

MECANISMO DE ACCIÓN: Actúa inhibiendo la división celular en los meristemos por lo tanto inhibe el crecimiento. El producto es absorbido por las hojas y transportado a las zonas de crecimiento.

Presentaciones: 100 G

Principales malezas



Portulaca oleracea



Ipomoea congesta



Sida acuta



Euphorbia spp.



Conmelina difusa

Maleza		Dosis	I.A.C*	I.R**
Nombre	Nombre científico			
Verdolaga	(Portulaca oleracea)	Pastos y arroz: 15 gr./Ha, 10,5 gr/Mz.	30 días	24 horas.
Frijolillo	(Phaseolus lathyroides)			
Uchuva	(Physalis sp)	Café: 10-15 gr./Ha, 7-10.5 gr./Mz.		
Batatilla	(Ipomoea congesta, H. flrita)			
Bledo	(Amaranthus hybridus)			
Cosa-cosa	(Sida carpinifolia)			
Lechecilla	(Euphorbia spp)			
Escoba	(Melochoia pyramidata)			
Meloncillo	(Cucumis melo)			
Pega pega	(Desmodium tortuosum)			
Yerba mora	(Solanum nigrum)			
Verbená morada	(Stachyrarpheta cayenensis)			
Botonillo	(Eclipta alba)			
Friega platos	(Walteria indica)			
Helecho	(Pteridium aquilinum)			
Balsilla	(Eupatorium odoratum)			
Modino blanco	(Clidemia hirta)			
Rabo de ratón	(Achyranthes indica)			
Escobillo	(Sida acuta)			
Dormilona	(Mimosa pigra)			

*Intervalo entre la última aplicación y cosecha **Intervalo de réingresso

Cultivo:

Pastos



Maíz



Caña de azúcar



Arroz



Cultivos autorizados: Pastos, maíz, caña de azúcar, arroz.



**Amigo agricultor,
CUIDA TU SALUD, COMO
CUIDAS TU CULTIVO.**



Instrucciones de uso



Instrucciones de manejo:

pH ÓPTIMO DEL AGUA: 5-7

FITOTOXICIDAD: El producto no es fitotóxico a las dosis y cultivos recomendados. Evite la deriva a cultivos susceptibles.

COMPATIBILIDAD: El producto es compatible con la mayoría de plaguicidas. No mezclar con productos alcalinos. Se recomienda utilizar una prueba de compatibilidad antes de efectuar la aspersión final.

ÉPOCA DE APLICACIÓN: En caña de azúcar y café aplicarse en post-emergencia para el control de hoja ancha y gramíneas con 3 a 5 hojas verdaderas (10 cm). En pastos aplicar cuando la maleza tiene entre 5 a 10 cm de altura. En arroz aplíquese en post-emergencia total. No aplicarse 25 días después de germinado el arroz.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Llenar una cubeta con agua limpia, verificando que el pH se encuentre entre 5-7, agregue la dosis recomendada y mezcle hasta observar una fase homogénea. Llene el tanque del equipo de aplicación hasta la mitad con agua limpia, verificando el pH, añadir una premezcla preparada del producto, agitar, observe la formación de una mezcla estable y homogénea. Deje activa la agitación durante todo el proceso de mezcla y aplicación. Use la mezcla el mismo día de la preparación. El equipo y los utensilios usados durante preparación de la mezcla, deben ser lavados después de cada jornada de trabajo; no contaminar fuentes de agua. Recuerde brindar mantenimiento permanente del equipo de aplicación.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Se puede aplicar por vía terrestre ya sea con equipo manual (bombas de mochila) o equipo impulsado por un tractor. Utilice boquillas de abanico plano y mantenga una presión constante en el equipo de aplicación. Previo a su uso, asegurar que el equipo de aplicación este en buenas condiciones de uso y calibrado. Es importante contar con el equipo auxiliar como cubetas, medidores, brochas, cepillos, dosificador, y otros que sean útiles en la preparación y aplicación del producto.

Pikette



Herbicidas

Recomendación Técnica:

Clic aquí:  **(+502) 3764-5454**

ACTUALIZACIÓN DE DATOS • 2026



agrocentro®
Agricultura Próspera y Sostenible para Todos



(+504) 2251-2300



AgrocentroHonduras



www.agrocentro.com