



Fungitane

43 SC

Descripción del producto:

FUNGITANE® 43 SC, es un fungicida protectante con amplio espectro de acción, del grupo Ditiocarbamatos.

Composición: Mancozeb 430 gramos por litro de producto comercial.

MODO DE ACCIÓN: Es protectante con un amplio espectro de control. Forma una capa protectora sobre el follaje, que inhibe la germinación de esporas, detiene el crecimiento del tubo germinativo e impide la formación de apresorios.

MECANISMO DE ACCIÓN: Es multisitio, Induce la inhibición de varias enzimas, inactiva grupos sulfidrilos (- SH), afecta ciclo de Krebs, impide formación de ATP, afecta lípidos de la membrana, inhibe respiración.

Presentaciones:

Caneca x 20 litros

Cultivos donde se utiliza:

Banano y Plátano.

Indicaciones generales:

COMPATIBILIDAD:

Es compatible con aceite agrícola para el control de zigatoka. FUNGITANE® 43 SC es compatible con la mayoría de agroquímicos, excepto con productos altamente alcalinos y preparados que contengan estaño.

Instrucciones de manejo:

pH óptimo del agua : 5

Como es preventivo debe aplicarse antes de la infección o cuando aparecen los primeros síntomas del ataque de la enfermedad. Las aplicaciones se deben repetir cada 7 a 15 días; el intervalo depende de la presión del inóculo y de la frecuencia e intensidad de las lluvias.

| Enfermedad / Agente Causal | Dosis | I.A.C* | I.R** |
|--|---|--------|--|
| Sigatoka negra (<i>Micosphaerella fijiensis</i>) | Banano y Plátano: 3,0 L/ha, 2,1 L/mz. | 0 días | Cuando la mezcla, sobre el follaje del cultivo, se haya secado, aproximadamente 24 horas después de la aplicación. |

*Intervalo entre la última aplicación y cosecha **Intervalo de réingresso

Principales enfermedades que controla



Sigatoka negra
(*Micosphaerella fijiensis*)



Sigatoka negra
(*Micosphaerella fijiensis*)



Sigatoka negra
(*Micosphaerella fijiensis*)



Sigatoka negra
(*Micosphaerella fijiensis*)

