



**Zafretero**  
**50 SC**

**Descripción del producto:**

ZAFRERO® 50 SC es un herbicida del grupo de las triazinas, se usa para controlar selectivamente malezas gramíneas y de hoja ancha, principalmente en la Caña de Azúcar, en aplicaciones tanto preemergentes como postemergentes.

**MECANISMO Y MODO DE ACCION:**

Se absorbe por el sistema radicular de las malezas transportándose vía xylema hasta las hojas. Actúa interfiriendo la acción fotosintética, provocando la muerte posterior de las plantas sensibles. La caña de azúcar es usualmente tolerable a la Ametrina, aunque existen hoy en día, algunas variedades que pueden mostrar cierta fitotoxicidad, la cual es momentánea, desapareciendo los síntomas pocos días después.

**Indicaciones generales:**

EN PREEMERGENCIA COMPLETA,  
Con el suelo bien preparado y húmedo

POST-EMERGENCIA,  
En forma temprana con malezas de no más de 4 a 6 hojas. Para aplicaciones con malezas de mayor tamaño, úsense las dosis más elevadas y mayor volumen de agua.

El efecto residual dependerá de las condiciones ambientales, tipo de suelo y estado de desarrollo de las malezas.

ZAFRERO® 50 SC no controla Rottboellia.

**Presentaciones:**

20 litros

**Instrucciones de manejo:**

**COMPATIBILIDAD:**

ZAFRERO® 50 SC Es compatible con la mayoría de los herbicidas de uso común en el cultivo de caña de azúcar, siendo usuales las mezclas con:

Atrazina, Hexazinona, Terbutrina, Diurón, Metsulfuron Methyl y Hormonales para ampliar el espectro en el control de malezas.


**Cultivos donde se utiliza:**

Caña de Azúcar  
Cítricos  
Piña  
Palma Africana

Malezas	Dosis	I.A.C*	I.R**
Mozote ( <i>Bidens pilosa</i> ) Botón Blanco o Botoncillo ( <i>Melanthera nivea</i> ) Verdolaga o Portulaca ( <i>Portulaca oleracea</i> ) Bledo o Hüisquelete ( <i>Amaranthus hybridus</i> ) Papayita o Crotón ( <i>Croton lobatus</i> ) Pascuita o Lechosa ( <i>Euphorbia heterophylla</i> ) Guarda rocío ( <i>Digitaria sanguinalis</i> ) Gramma de agua ( <i>Echinochloa cruspavonis</i> ) Arrocillo ( <i>Echinochloa colonum</i> ) Pasto Honduras ( <i>Ixophorus unisetus</i> ) Pajilla ( <i>Panicum fasciculatum</i> ) Plumilla ( <i>Leptochloa filiformis</i> ) Coyolillo ( <i>Cyperus flavus</i> ) Pata de gallina ( <i>Eleusine indica</i> ) Cola de zorro ( <i>Setaria geniculata</i> )	2 a 4 L/ha  Puede variar en mezclas de 1.5 a 2.5 L/ha	<i>No aplica por el tipo de aspersión</i>	Preemergencia, se puede ingresar pocos minutos después de la Aplicación.  En las post-emergentes, se debe esperar a que el rocío de la aspersión se haya secado sobre el follaje de malezas y/o de la caña.

\*Intervalo entre la última aplicación y cosecha \*\*Intervalo de reíngreso

### Principales malezas que controla



Mozote (*Bidens pilosa*)



Verdolaga (*Portulaca oleracea*)



Papayita (*Croton lobatus*)



Guarda rocío (*Digitaria sanguinalis*)



Coyolillo (*Cyperus flavus*)



Cola de zorro (*Setaria geniculata*)

