

Eskobiyol

60 WP

Descripción del producto:

ESKOBIYOL® 60 WP es un herbicida sistémico a base de metsulfuron metil que pertenece al grupo de las sulfonilureas.

COMPOSICIÓN: 600 gramos de Metsulfuron Metil por kilogramo de producto comercial.

MODO y MECANISMO DE ACCIÓN:

Bloquea la síntesis de los aminoácidos isoleucina, leucina y valina, porque inhibe la acción de la enzima aceto-lactato-sintetasa.

Esto provoca que cuando la molécula entra a la planta, los puntos de crecimiento se detienen en unas horas, pero los daños de necrosis y muerte de los meristemas aparecen en un período de tres semanas después de la aplicación de ESKOBIYOL® 60 WP.

Indicaciones generales:

Controla un amplio espectro de malezas de hoja ancha anuales y perennes, y algunas gramíneas.

COMPATIBILIDAD:

Puede mezclarlo con Glifosato Aleman, Elimina, Picloram; en todo caso, realizar pruebas de compatibilidad

INCOMPATIBILIDAD

No utilizar ESKOBIYOL® 60 WP en mezcla con insecticidas organofosforados, tampoco emplear este tipo de insecticidas 7 días antes y 7 días después de la aplicación de ESKOBIYOL® 60 WP, no mezclar con fertilizantes líquidos que tengan pH menos o igual que 3.

Nota: Es importante el uso de surfactantes y penetrantes.

Presentaciones:

10 gramos y 100 gramos

Cultivos donde se utiliza:

Arroz
Caña de azúcar
Café
Potreros o Pastos
Palma Africana o de Aceite

Instrucciones de manejo:

pH ÓPTIMO DEL AGUA: 5.5 - 6.5

ÉPOCA DE APLICACIÓN: Cuando las malezas tengan preferiblemente una altura no mayor de 15 cm de altura o bien de 3 a 4 hojas verdaderas.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

En el tanque de mezcla llene hasta la mitad de su capacidad con agua; adicione la dosis de Eskobiyol 60 WP y complete el nivel de agua recomendada.

EQUIPO DE APLICACIÓN:

Es esencial hacer la aspersión con precisión y cubrir totalmente la maleza. Asegúrese de que las boquillas estén en buenas condiciones y que el aguilón de la aspersora esté ajustado a una altura adecuada que garantice la cobertura total.

Malezas		Dosis	I.A.C*	I.R**
Zirín	(<i>Clidemia sp.</i>)	DOSIS GENERAL: 10 a 30 grs/ha	15 Días	Esperar 12 horas para reingresar. Si necesita reingresar antes esperar que se seque bien la aspersión y utilizar equipo completo de protección personal.
Escobillo	(<i>Waltheria indica</i>)			
Picha de gato	(<i>Achyranthes indica</i>)			
Bejuco	(<i>Ipomoea sp.</i>)			
Chispa o Helecho	(<i>Pteridium aquilinum</i>)			
Dormilona	(<i>Mimosa pigra</i>)			
Escoba	(<i>Sida acuta</i>)			
Clidemia peluda	(<i>Clidemia rubra</i>)			
Clidemia verde	(<i>Climedia hirta</i>)			
Emilia	(<i>Emilia sonchifolia</i>)			
Lechosas	(<i>Euphorbia sp.</i>)	Aplicaciones especiales: Malanguilla 20 gr/ha		
Miltomate	(<i>Physalis angulata</i>)			
Yerba Mora	(<i>Solanum nigrum</i>)	Bejucos 20 grs/100L agua		
		Helechos y Clidemias 20 a 40 grs/ha		

*Intervalo entre la última aplicación y cosecha **Intervalo de reingreso

Principales malezas que controla



Escobillo (*Waltheria indica*)



Chispa o Helecho (*Pteridium aquilinum*)



Escoba (*Sida acuta*)



Emilia (*Emilia sonchifolia*)



Miltomate (*Physalis angulata*)



Yerba Mora (*Solanum nigrum*)

