



**Descripción del producto:**

FUNGITANE® 60 SC

Fungicida

**COMPOSICIÓN:** Este producto contiene 600 gramos de Mancozeb por cada litro de producto comercial.

**MODO DE ACCIÓN:** Es un fungicida protectante de amplio espectro, para el control de enfermedades, actúa como multi sitio, formando una capa protectora sobre el follaje, que inhibe la germinación de esporas, deteniendo crecimiento de tubo germinativo y formación del apresorio.

**MECANISMO DE ACCIÓN:** Inhibe el desarrollo del tubo germinativo de la espora del hongo; ya que bloquea los procesos enzimáticos a nivel de citoplasma y mitocondria, lo que ocasiona una deficiencia de ATP en la célula.



RECOMENDACIÓN

**VER PANFLETO**

**Presentaciones:** 5L 20L 20L 200L

**Principales hongos**



Sigatoka Negra

Hongos		Dosis	I.A.C*	I.R**
Nombre	Nombre científico			
Sigatoka negra	<i>Mycosphaerella fijiensis</i>	2 L/ha (1,4 L/mz) en 200 L de agua. Iniciar la aplicación cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad.	Cero días	Después de que el producto se haya secado en el cultivo; aproximadamente en 24 horas.

\*Intervalo entre la última aplicación y cosecha \*\*Intervalo de réingresso

## Cultivo:

Banano, Plátano.



**Cultivos autorizados:** Banano, Plátano.

**Amigo agricultor,  
CUIDA TU SALUD, COMO  
CUIDAS TU CULTIVO.**



## Instrucciones de uso



### Instrucciones de manejo:

**pH ÓPTIMO DEL AGUA:** 5

**FITOTOXICIDAD:** No es fitotóxico a los cultivos recomendados en este panfleto siempre y cuando se respeten las dosis recomendadas.

**COMPATIBILIDAD:** FUNGITANE 60 SC, se puede mezclar con la mayoría de los agroquímicos. No mezclar con productos alcalinos.

**ÉPOCA DE APLICACIÓN:** Aplicar FUNGITANE 60 SC cada 7 días, con un máximo de 16 aplicaciones por ciclo de cultivo.

**PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:** Llene la aspersora o el tanque de mezcla con agua hasta la mitad de su capacidad, verificar el pH del agua, realice las correcciones necesarias de pH y dureza del agua, pH en un rango de 5, y dureza del agua menor a 60 PPM, aplicar la dosis recomendada de FUNGITANE 60 SC, al tanque de la aspersora o al tanque de mezcla, manteniendo una agitación constante, adicionar el coadyuvante y por último llenar la aspersora con la totalidad de su capacidad con agua.

Si se mezcla con formulaciones WP, WG, SG, realizar una premezcla de estos para tener una mejor dilución, ya finalizado incorpórelos al tanque de mezcla o a la aspersora, incorporar FUNGITANE 60 SC a la dosis recomendada, es importante mantener la agitación constante, adicione su coadyuvante agrícola y por último llenar la aspersora con la totalidad de su capacidad con agua.

**EQUIPO DE APLICACIÓN:** Debe ser aplicado en forma de aspersión foliar, mediante equipo terrestre, accionado por tractor o aspersora de espalda o aspersoras de presión constante, así como aplicaciones aéreas. El equipo debe estar en condiciones adecuadas de uso, utilizar boquilla que se acople a las condiciones del cultivo. FUNGITANE 60 SC, no es corrosivo para los equipos de aplicación.

 **Fungitane**



## VER PANFLETO

Recuerde revisar el panfleto y consultar a su Asesor Técnico

### CONSULTA TÉCNICA:

ACTUALIZACIÓN DE DATOS • 2024

  
**agrocentro**<sup>®</sup>  
Agricultura Próspera y Sostenible para Todos

 (+502) 3764-5454

 AgrocentroGuatemala

 [www.agrocentro.com](http://www.agrocentro.com)