



Descripción del producto:

Fiador® 0,8 GR

Insecticida

COMPOSICIÓN: Este producto contiene 8 gramos de Imidacloprid por cada Kg de producto comercial.

MODO DE ACCIÓN: Actúa en forma sistémica, por ingestión y por contacto; con un efecto sistémico acropetal en la planta.

MECANISMO DE ACCIÓN: Actúa sobre el sistema nervioso central de los insectos; interfiere con la transmisión de los estímulos en el sistema nervioso, produciendo acumulación de acetilcolina, un importante neurotransmisor, lo que resulta en la parálisis del insecto y su muerte.

RECOMENDACIÓN



VER PANFLETO

Presentaciones:

250g

800g

1kg

25kg

50kg

Principales plagas



Agriotes spp.
Conoderus spp.



Phyllophaga spp.



Cosmopolites sordidus.

Plagas		Dosis	I.A.C*	I.R**
Nombre	Nombre científico			
Gallina ciega	<i>Phyllophaga spp.</i>			
Gusano alambre	<i>Agriotes spp. Conoderus spp.</i>	Caña de azúcar, maíz, sorgo y pastos: 16 kg/ha (11 kg/mz).	El intervalo recomendado es de 21 días.	Después de que se aplique el producto en la base de la planta, aproximadamente 24 horas.
Picudo negro del banano.	<i>Cosmopolites sordidus.</i>	Banano y plátano: 40 kg / ha (28 kg / mz) o 25 g por planta		

*Intervalo entre la última aplicación y cosecha **Intervalo de réingresso

Cultivo:

Maíz



Banano



Caña de azúcar



Pastos



Sorgo



Cultivos autorizados: Caña de azúcar, maíz, sorgo, banano, plátano, pastos.



**Amigo agricultor,
CUIDA TU SALUD, COMO
CUIDAS TU CULTIVO.**



Instrucciones de uso



Instrucciones de manejo:

pH ÓPTIMO DEL AGUA: NA.

FITOTOXICIDAD: Ninguna fitotoxicidad cuando se aplica solo y de acuerdo con las instrucciones de uso.

COMPATIBILIDAD: Se aplica solo; por lo que no se debe mezclar con otros productos agrícolas.

ÉPOCA DE APLICACIÓN: Se debe empezar a aplicar al observar los primeros indicios de la plaga cada 60 días si hay reaparición de la plaga.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: No requiere de preparación de mezclas por ser un granulado. Se aplica directamente a la base de la planta.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Caña de azúcar: aplicar con granuladora debidamente calibrada.

Resto de cultivos: aplicar FIADOR 0,8 GR a la base de la planta cuando exista presencia de la plaga, puede utilizar recipientes para transportar el insecticida y así movilizarse entre los surcos del cultivo.

FIADOR



Insecticida



VER PANFLETO

Recuerde revisar el panfleto y consultar a su Asesor Técnico

CONSULTA TÉCNICA:

ACTUALIZACIÓN DE DATOS • 2024



agrocentro[®]

Agricultura Próspera y Sostenible para Todos



(+502) 3764-5454



AgrocentroGuatemala



www.agrocentro.com