

Germibien[®]

GT



Descripción del producto:

Germibien[®] 35 FS

Insecticida

COMPOSICIÓN: Este producto contiene 350 gramos de Thiodicarb por cada litro de producto comercial.

MODO DE ACCIÓN: Es un insecticida, que se aplica en la semilla, liberando el ingrediente activo en la zona del suelo; proporcionando control sobre los insectos plaga por contacto e ingestión. GERMIBIEN 35 FS se absorbe por la raíz y se distribuye

RECOMENDACIÓN



VER PANFLETO

en toda la planta, iniciando así el control de plagas aéreas y de suelo, para proteger durante la germinación y la primera etapa de desarrollo de los cultivos.

MECANISMO DE ACCIÓN: El thiodicarb inhibe la enzima acetilcolinesterasa (AChE), interrumpiendo la transmisión de los impulsos nerviosos en el insecto lo cual, eventualmente, termina en su muerte.

Presentaciones:

100mL

250mL

500mL

1L

200L

Principales plagas



Agriotes spp.
Conoderus spp.



Phyllophaga spp.



Spodoptera exigua

Plagas		Dosis	I.A.C*	I.R**
Nombre	Nombre científico			
Gusano nochero	<i>Spodoptera exigua</i>	Aplicar 1 litro de GERMIBIEN 35 FS por cada 46 kg de semilla (100 libras).	No aplica, ya que es un producto que se aplica a la semilla previo a la siembra.	Debe esperar mínimo 24 horas.
Gallina ciega	<i>Phyllophaga spp.</i>			
Gusano alambre	<i>Agriotes spp.</i> <i>Conoderus spp.</i>			

*Intervalo entre la última aplicación y cosecha **Intervalo de réingresso

Cultivo:

Maíz



Trigo



Avena



Cebada



Sorgo



Cultivos autorizados: Maíz, sorgo, maicillo, trigo, avena, cebada, centeno

**Amigo agricultor,
CUIDA TU SALUD, COMO
CUIDAS TU CULTIVO.**



Instrucciones de uso



Instrucciones de manejo:

pH ÓPTIMO DEL AGUA: 5.5 - 6 pH

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a los cultivos y dosis recomendadas en el panfleto.

COMPATIBILIDAD: La formulación GERMIBIEN 35 FS es compatible con la mayoría de los productos agrícolas; sin embargo, no recomendamos mezclar con fungicidas a base de Maneb, Zineb u Oxidloruro de cobre, o productos muy alcalinos.

ÉPOCA DE APLICACIÓN: Se aplica una sola vez, ya que es un tratamiento de semillas previo a la siembra.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: En un tambor giratorio o maquina tratadora de semilla, colocar la semilla a tratar, aplique directo del recipiente la dosis requerida, agitar vigorosamente hasta que quede toda la semilla impregnada, se deja secar por 45 minutos; una vez seca, se procede a sembrar. Si utiliza más de 25 libras de semilla, se procede a esparcirla sobre un plástico y a esta se le asperjar el producto mediante aspersora de espalda, se deja secar y una vez seca, se coloca en las tolvas de la sembradora. GERMIBIEN 35 FS no necesita mezclarse ni diluirse en agua para su aplicación; ya que viene listo para usarse.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Para el uso correcto de GERMIBIEN 35 FS en el tratamiento de semilla, se puede usar equipo como tambor giratorio o maquina tratadora de semilla, bolsas herméticas o recipientes de volumen conocido, pues se busca que la semilla quede cubierta con el insecticida (como se explicó en la preparación de mezcla), y para la operación directa a campo, se puede utilizar sembradoras mecánicas, sembradoras manuales, luego se debe lavar los equipos utilizados, GERMIBIEN 35 FS no corrosivo para los equipos.

Germibien[®]



Insecticida



VER PANFLETO

Recuerde revisar el panfleto y consultar a su Asesor Técnico

CONSULTA TÉCNICA:

ACTUALIZACIÓN DE DATOS • 2024



agrocentro[®]

Agricultura Próspera y Sostenible para Todos



(+502) 3764-5454



AgrocentroGuatemala



www.agrocentro.com