

Konflikt



Descripción del producto:

Konflikt® 30,4 SL

Herbicida

COMPOSICIÓN: Este producto contiene 240 gramos de 2,4-D y 64 gramos de Picloram por cada litro de producto comercial

MODO DE ACCIÓN: Es un herbicida sistémico, absorbido rápidamente por raíces y hojas y traslocado, acumulándose en los meristemos, para el control de hoja ancha.

RECOMENDACIÓN



VER PANFLETO

MECANISMO DE ACCIÓN: Los ingredientes activos interfieren la síntesis de ácidos nucleicos, por lo consiguiente ocasiona pérdida del crecimiento por atrofia de los haces vasculares, produciendo la muerte de la planta.

Presentaciones:

1L

3.5L

18L

Principales malezas



Asclepia curassavica



Lantana camara



Mimosa pigra



Mimosa pudica



Acacia cornigera

Maleza		Dosis	I.A.C*	I.R**
<p>Nombre</p> <p>Viborana</p> <p>Cinco negritos</p> <p>Zarza de playa</p> <p>Zarza dormilona</p> <p>Huevo de chucho</p> <p>Irayol</p> <p>Ixcanal</p> <p>Guachimol</p>	<p>Nombre científico</p> <p><i>Asclepia curassavica</i></p> <p><i>Lantana camara</i></p> <p><i>Mimosa pigra</i></p> <p><i>Mimosa pudica</i></p> <p><i>Ahouai nitida</i></p> <p><i>Genira americana</i></p> <p><i>Acacia cornigera</i></p> <p><i>Pithecellobium lanceolatum</i></p>	<p>Pastos y Maíz: 2.15 - 3.58 L/ha en 160 litros de agua. (1,50 - 2.50 L/mz en 112 litros de agua, por manzana).</p> <p>Observaciones: Aplicar el producto cuando las malezas se encuentren metabólicamente activas entre 0.1 a 0.5 metros de altura o cuando la maleza tenga de 3 a 4 hojas formadas.</p>	<p>Maíz: 60 días.</p> <p>Pastos: 30 días.</p>	<p>Después que la mezcla con el producto se haya secado en el follaje del cultivo tratado; aproximadamente 24 horas.</p>

*Intervalo entre la última aplicación y cosecha **Intervalo de réingresso

Cultivo:

Maíz



Pastos



Cultivos autorizados: Maíz, pastos.

**Amigo agricultor,
CUIDA TU SALUD, COMO
CUIDAS TU CULTIVO.**



Instrucciones de uso

Instrucciones de manejo:

pH ÓPTIMO DEL AGUA: 5 - 7 PH

FITOTOXICIDAD: No presenta fitotoxicidad a las dosis recomendadas.

COMPATIBILIDAD: Konflikt 30, 4 SL es compatible con propanil, atrazina, ametrina, diuron y paraquat.

ÉPOCA DE APLICACIÓN: Por lo general con una aplicación es suficiente en los cultivos antes mencionados. Pastos: Se recomienda realizar la aplicación del producto Sobre malezas metabólicamente activas que tengan una altura comprendida entre 10 y 50 centímetros de altura para obtener mejores resultados.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Verter agua limpia en el tanque de aplicación, seguidamente se agrega la dosis requerida de Konflikt 30,4 SL agitando la mezcla, completar con agua el tanque de mezcla. Verifique el pH de su fuente de agua, puede hacerlo por medio de tiras indicadoras de pH, este producto funciona mejor en un pH de 5, de ser necesario realice correcciones. Asegúrese de contar con medidores para líquidos, cubetas graduadas, paletas de agitación, cepillo para limpiar las boquillas.

Después de usar este producto, se recomienda lavar con suficiente agua y jabón el equipo de aspersión y dejarlo secar.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Al aplicar Konflikt 30,4 SL, debe usarse guantes, botas de hule, mascarilla, anteojos y overol de manga larga. Se recomienda usar aspersora de mochila, equipo accionado por tractor. Asegurese que el equipo de aspersión esté en buenas condiciones de funcionamiento, libre de derrames, filtros limpios, dosificador, boquillas de abanico 8003 ó 8004 o su equivalente, debidamente calibrado y a una presión de 20 a 30 libras por pulgada cuadrada.

Konflikt

 **Herbicidas**



VER PANFLETO

Recuerde revisar el panfleto y consultar a su Asesor Técnico


CONSULTA TÉCNICA:

ACTUALIZACIÓN DE DATOS • 2024



agrocentro[®]

Agricultura Próspera y Sostenible para Todos

 **(+502) 3764-5454**

 **AgrocentroGuatemala**

 **www.agrocentro.com**